

# Les principaux sites d'intérêt ornithologique de Chypre Nord

Voyage naturaliste, mars 2016



Vincent LIEBAULT

# Sommaire

---

<b>Contexte</b>	<b>3</b>
<b>Secteur de plaine entre Nicosie et Framagouste</b>	<b>5</b>
<b>Secteur de la péninsule de Karpas</b>	<b>12</b>
<b>Secteurs de la chaîne de Kyrenia</b>	<b>18</b>
<b>Secteur de Koruçam</b>	<b>21</b>
<b>Annexe : les taxons observés</b>	<b>30</b>

## Contexte

L'île de Chypre est une destination reconnue pour l'observation des oiseaux. Elle accueille une diversité importante d'espèces méditerranéennes dont deux espèces endémiques : la Fauvette de Chypre et le Traquet de Chypre.

La frontière qui divise l'île en deux et les contraintes de traversée amènent bien souvent les ornithologues en séjour à choisir la partie grecque qui offre une plus grande diversité de milieux et plus d'équipements touristiques. Les publications et comptes rendus de voyage concernant la partie turque sont de ce fait beaucoup plus nombreux, ce qui valorise d'autant plus cette partie de l'île. La partie turque n'en est pourtant pas moins intéressantes. La côte nord et les péninsules sont notamment des sites privilégiés pour l'observation des migrateurs. Chypre se situe en effet entre deux grandes voies de migration, l'une des Balkans vers l'Afrique, et l'autre de la Russie occidentale vers le Sud par la Palestine jusqu'à l'Afrique de l'Est. Les sites naturels de la côte nord sont des lieux propices à l'observation d'oiseaux en haltes migratoires, notamment lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

Ce compte rendu propose une présentation des principaux sites d'intérêt ornithologique de Chypre Nord et la liste des espèces observées lors d'un séjour réalisé du 15 au 24 mars 2016. Ce séjour a permis l'observation de 103 espèces d'oiseaux. La période choisie visait l'observation des migrateurs ainsi que des nicheurs précoces (Francolin noir, Traquet de Chypre, Fauvette de Chypre). Certains nicheurs tardifs n'étaient pas encore arrivés sur leurs sites de nidification (Pie-grièche masquée). Les conditions météorologiques très clémentes ont été peu favorables aux haltes migratoires. Quelques limicoles ont néanmoins pu être observés sur les zones humides ainsi que quelques espèces plus occasionnelles (Busard pâle, Fauvette de Rüppell, Traquet de Finsch).

L'ensemble des informations est également disponible en version géolocalisée au format Google Earth téléchargeable via ce lien :

<http://vliebault.free.fr/voyage/Chypre/Chypre2016.kmz>





*Itinéraire et sites visités*





## Secteur de plaine entre Nicosie et Framagouste

A l'est de Nicosie, d'importants bassins de lagunage associés aux terres agricoles environnantes attirent de nombreux oiseaux nicheurs et migrateurs typiques des zones humides. En hiver, ce secteur accueille notamment l'Erismature à tête blanche. Dans la continuité de cette zone humide s'étendant vers l'est la plaine céréalière de Mesaoria où peuvent être observées à la fois des espèces typiques des plaines agricoles mais aussi des espèces des milieux humides profitant des quelques plans d'eau dont le Lac de Kouklia. Enfin, sur le littoral à proximité de Framagouste, quelques lagunes sont propices à l'observation de limicoles et d'oiseaux en halte migratoire malgré leur état très dégradé.



*Secteur de plaine entre Nicosie et Framagouste*

### 1. Lagunage de Nicosie

(35.188635°, 33.426889°)

#### **Vanneau éperonné**

Bécassine des marais  
Bergeronnette printanière  
Canard colvert  
Chevalier culblanc  
Echasse blanche  
Grèbe castagneux  
Milan noir  
Petit Gravelot



## 2. Plaine de Strongylos

(35.176227°, 33.601091°)

Bergeronnette printanière  
 Bruant proyer  
 Cisticole des joncs  
 Cochevis huppé  
 Corneille mantelée  
 Coucou geai  
 Faucon crécerelle  
**Francolin noir**  
 Hirondelle de fenêtre  
 Hirondelle rustique  
 Mésange charbonnière  
 Moineau domestique  
 Œdicnème criard  
 Perdrix Choukar  
 Pie bavarde  
 Pigeon ramier  
 Tourterelle turque



*Francolin noir*

## 3. Lac de Kouklia

(35.121706°, 33.761030°)

### **Alouette calandre**

Bergeronnette grise  
 Bergeronnette printanière  
 Bouscarle de Cetti  
 Bruant proyer  
 Busard des roseaux  
 Busard Saint-Martin  
 Caille des blés  
 Canard colvert  
 Canard souchet  
 Chevalier aboyeur  
 Chevalier cul-blanc  
 Chevalier gambette  
 Chevalier sylvain  
 Choucas des tours  
 Cisticole des joncs  
 Combattant varié  
 Coucou geai



Echasse blanche  
 Faucon crécerelle  
 Foulque macroule  
**Francolin noir**  
 Gallinule poule d'eau  
 Gorgebleue à miroir  
 Gravelot à collier interrompu  
 Grèbe castagneux  
 Guêpier d'Europe  
 Héron cendré  
 Huppe fasciée  
 Martinet noir  
 Mésange charbonnière  
 Œdicnème criard  
 Petit gravelot  
 Pipit farlouse  
 Râle d'eau  
 Rousserolle effarvatte  
 Sarcelle d'hiver  
**Vanneau éperonné**



*Vanneau éperonné*



#### 4. Lagune de Framagouste

(35.170004°, 33.907477°)

Aigrette garzette  
Chevalier aboyeur  
Cochevis huppé  
Courlis cendré  
**Francolin noir**  
Gravelot à collier interrompu  
Pigeon domestique  
Sarcelle d'hiver

#### 5. Vestiges de Salamis

(35.183755°, 33.901345°)

Fauvette mélanocéphale	
<b>Francolin noir</b>	
Goéland d'Audouin	Rougequeue noir
Martinet à ventre blanc	Sterne caugek
Pouillot véloce	Verdier d'Europe





## 6. Plaine de Yıldırım

(35.247189°, 33.783376°)

Fauvette à lunettes

Grive musicienne

Mésange charbonnière

Traquet de Chypre

Traquet motteux



## 7. Piste de Topçuköy

(35.335192°, 33.839947°)

Coucou geai

Fauvette à tête noire

Fauvette de Chypre

Francolin noir

Linotte mélodieuse

Moineau espagnol

Serin cini

Verdier d'Europe







### 7. Piste à l'est de Kumyali

(35.438881°, 34.171056°)

Bihoreau gris  
 Bouscarle de Cetti  
 Bruant proyer  
 Busard des roseaux  
 Caille des blés  
 Chevêche d'Athéna  
 Coucou geai  
 Fauvette de Chypre  
 Fauvette mélanocéphale  
**Francolin noir**  
 Hirondelle rousseline  
 Huppe fasciée  
 Mésange charbonnière  
 Monticole de roche  
 Œdicnème criard  
 Rougegorge familier  
 Traquet de Chypre  
 Traquet motteux







## Secteur de la péninsule de Karpas

La péninsule de Karpas révèle des paysages typiques avec ses collines ondulées, son maquis et ses terres agricoles extensives. Cette partie de l'île est interdite à la chasse et reste encore bien préservée de l'urbanisation. Il s'agit d'un des secteurs les plus remarquables de Chypre pour l'observation des oiseaux, avec plusieurs espèces endémiques ainsi que des effectifs significatifs pour pas moins de quatre espèces à enjeu mondiale de conservation. Les îles rocheuses de Kleides et l'îlot de Lefkoniso sont notamment les seuls sites de reproduction de Chypre pour le Goéland d'Audouin.



Secteur de la péninsule de Karpas

### 8. Route de Kumyali à Dipkarpaz

(35.515774°, 34.303872°)

#### **Fauvette de Chypre**

#### **Francolin noir**

Goéland leucophée

Huppe fasciée

Pigeon biset

Tarier pâle

#### **Traquet de Chypre**

*Laudakia stellio cypriaca* (reptile)

Couleuvre de Chypre *Hierophis cypriensis* (reptile)





*Traquet de Chypre*



*Laudakia stellio cypriaca*

#### 9. Route sud entre Dipkarpaz et le cap

(35.601525°,34.435206°)

##### **Buse des steppes**

Caille des blés

Fauvette passerinette

**Francolin noir**

**Traquet de Chypre**



*Francolin noir*



## 10. Dunes de Golden Beach

(35.644347°, 34.548399°)

Cormoran huppé  
Puffin yelkouan  
**Goéland d'Audouin**





## 11. Cap de la péninsule de Karpas

(35.695017°, 34.587839°)

Faucon crécerelle  
Fauvette à lunettes  
Fauvette à tête noire  
**Goéland d'Audouin**  
Grand cormoran  
Héron cendré  
Martinet à ventre blanc

Martinet noir  
Mésange charbonnière  
Pouillot véloce  
**Traquet de Finsch**  
Traquet motteux  
**Traquet isabelle**  
*Phoenicolacerta troodica* (Reptile)



*Traquet isabelle*



*Traquet de Finsch*



*Phoenicolacerta troodica*






## 12. Piste au nord de la péninsule de Karpas

(35.662863°, 34.510531°)

Bouscarle de Cetti  
 Faucon pèlerin  
 Fauvette à lunettes  
**Francolin noir**  
 Grand corbeau  
 Pinson des arbres  
**Traquet de Chypre**



*Traquet de Chypre*



*Traquet de Chypre*



### 13. Piste au nord-est de Dipkarpaz

(35.634540°,34.394035°)

Chevêche d'Athéna

Epervier d'Europe

**Francolin noir**

Tarier pâtre

**Traquet de Chypre**



*Francolin noir*

## Secteurs de la chaîne de Kyrenia

Ce secteur correspond au massif montagneux qui s'étend le long de la côte nord de l'île. La face sud de la chaîne est constituée de pentes escarpées et dénudées qui contrastent avec les pentes plus humides orientées vers le nord recouvert de broussailles et de forêts mixtes de pins et de cyprès. On y trouve des densités importantes de Faucon pèlerin et d'Aigle de Bonelli. C'est aussi un site de nidification pour de nombreuses espèces méditerranéennes et notamment pour les espèces endémiques telles que la Fauvette de Chypre et le Traquet de Chypre.



*Secteurs de la chaîne de Kyrenia*

### 14. Falaise de Yiouti

(35.470391°, 34.039639°)

Chevêche d'Athéna  
Choucas des tours  
Faucon crécerelle  
Martinet à ventre blanc  
Monticole bleu

### 15. Est de la chaîne de Kyrenia

(35.358053°, 33.791077°)

Choucas des tours  
Coucou gris  
Faucon pèlerin  
**Fauvette de Chypre**  
Fauvette mélanocéphale



Linotte mélodieuse  
Martinet à ventre blanc  
Mésange charbonnière  
Monticole bleu  
**Petit duc scops de Chypre**  
**Traquet de Chypre**  
Troglodyte mignon





## 16. Montagne du Kyparissovouno

(35.319201°, 33.161774°)

Faucon pèlerin

Monticole bleu


Troglodyte mignon





## Secteur de Koruçam

Sur la partie nord-ouest de l'île s'étend la péninsule de Koruçam, avec sa côte rocheuse, de vastes étendues de garrigue, des parcelles de pinède de basse altitude et de terres céréalières extensives. Plus au sud, le littoral rocheux laisse place aux dunes et aux embouchures de plusieurs cours d'eau formant des écosystèmes particulièrement riches. Ce secteur est réputé pour l'observation d'oiseaux en migration ou en halte migratoire.



*Secteur de Koruçam*

### 17. Est de Koruçam

(35.364092°, 32.989486°)

Chevêche d'Athéna  
**Fauvette de Chypre**  
**Fauvette de Rüppell**  
 Hirondelle de fenêtre  
 Hirondelle de rochers  
 Hirondelle rousseline  
 Œdicnème criard  
 Pipit des arbres  
 Tarin des aulnes





*Fauvette de Rüppell*

### 18. Cap Koruçam

(35.396346°, 32.926110°)

Alouette calandrelle

**Bruant cendrillard**

Bruant proyer

**Busard pâle**

Effraie des clochers

**Faucon d'Eléonore**

**Fauvette de Chypre**

**Francolin noir**



Guêpier d'Europe  
 Linotte mélodieuse  
 Œdicnème criard  
 Rougequeue à front blanc  
 Serin cini  
 Tarin des aulnes  
 Traquet isabelle  
 Traquet motteux  
 Traquet oreillard  
*Laudakia stellio cypriaca* (Reptile)



*Laudakia stellio cypriaca*



*Busard pâle*



*Bruant cendrillard*





*Bruant proyer*







*Traquet oreillard*



*Traquet isabelle*

### 19. Körmacit Deresi et son embouchure

(35.336100°, 32.957107°)

Alouette calandrelle

**Bruant cendrillard**

Caille des blés

Chevêche d'Athéna

Cochevis huppé

Fauvette à lunettes

**Fauvette de Chypre**

**Francolin noir**

Gravelot à collier interrompu

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle rousseline

Œdicnème criard

Pipit des arbres

Rougegorge familier

Tarier des prés

**Traquet de Chypre**

Traquet oreillard

Verdier d'Europe

*Ophisops elegans* (Reptile)



*Bruant cendrillard*







## 20. Embouchure du Çiftlik Deresi

(35.268664°, 32.936346°)

Alouette calandrelle

Caille des blés

Cochevis huppé

Coucou geai

Fauvette à lunettes

**Francolin noir**

Mésange charbonnière

Pipit des arbres

Œdicnème criard

*Ophisops elegans* (Reptile)







*Ophisops elegans*



## Annexe : liste des taxons observés

Taxon	UICN
Aigrette garzette ( <i>Egretta garzetta</i> )	LC
Alouette calandre ( <i>Melanocorypha calandra</i> )	LC
Alouette calandrelle ( <i>Calandrella brachydactyla</i> )	LC
Bécassine des marais ( <i>Gallinago gallinago</i> )	LC
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	LC
Bergeronnette printanière ( <i>Motacilla flava</i> )	LC
Bihoreau gris ( <i>Nycticorax nycticorax</i> )	LC
Bouscarle de Cetti ( <i>Cettia cetti</i> )	LC
Bruant cendrillard ( <i>Emberiza caesia</i> )	LC
Bruant proyer ( <i>Miliaria calandra</i> )	LC
Busard des roseaux ( <i>Circus aeruginosus</i> )	LC
Busard pâle ( <i>Circus macrourus</i> )	NT
Busard Saint-Martin ( <i>Circus cyaneus</i> )	LC
Buse des steppes ( <i>Buteo buteo vulpinus</i> )	LC
Caille des blés ( <i>Coturnix coturnix</i> )	LC
Canard colvert ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	LC
Canard souchet ( <i>Anas clypeata</i> )	LC
Chevalier aboyeur ( <i>Tringa nebularia</i> )	LC
Chevalier culblanc ( <i>Tringa ochropus</i> )	LC
Chevalier gambette ( <i>Tringa totanus</i> )	LC
Chevalier sylvain ( <i>Tringa glareola</i> )	LC
Chevêche d'Athéna ( <i>Athene noctua</i> )	LC
Choucas des tours ( <i>Corvus monedula</i> )	LC
Cisticole des joncs ( <i>Cisticola juncidis</i> )	LC
Cochevis huppé ( <i>Galerida cristata</i> )	LC
Combattant varié ( <i>Philomachus pugnax</i> )	LC

Taxon	UICN
Cormoran huppé ( <i>Phalacrocorax aristotelis</i> )	LC
Corneille mantelée ( <i>Corvus cornix</i> )	LC
Coucou geai ( <i>Clamator glandarius</i> )	LC
Coucou gris ( <i>Cuculus canorus</i> )	LC
Courlis cendré ( <i>Numenius arquata</i> )	LC
Echasse blanche ( <i>Himantopus himantopus</i> )	LC
Effraie des clochers ( <i>Tyto alba</i> )	LC
Epervier d'Europe ( <i>Accipiter nisus</i> )	LC
Faucon crécerelle ( <i>Falco tinnunculus</i> )	LC
Faucon d'Eléonore ( <i>Falco eleonorae</i> )	LC
Faucon pèlerin ( <i>Falco peregrinus</i> )	LC
Fauvette à lunettes ( <i>Sylvia conspicillata</i> )	LC
Fauvette à tête noire ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	LC
Fauvette de Chypre ( <i>Sylvia melanothorax</i> )	LC
Fauvette de Rüppell ( <i>Sylvia ruppeli</i> )	LC
Fauvette mélanocéphale ( <i>Sylvia melanocephala</i> )	LC
Fauvette passerinette ( <i>Sylvia cantillans</i> )	LC
Foulque macroule ( <i>Fulica atra</i> )	LC
Francolin noir ( <i>Francolinus francolinus</i> )	LC
Gallinule poule-d'eau ( <i>Gallinula chloropus</i> )	LC
Goéland d'Audouin ( <i>Larus audouini</i> )	NT
Goéland leucophée ( <i>Larus cachinnans</i> )	LC
Gorgebleue à miroir ( <i>Luscinia svecica</i> )	LC
Grand Corbeau ( <i>Corvus corax</i> )	LC
Grand Cormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	LC
Gravelot à collier interrompu ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	LC



Taxon	UICN
Grèbe castagneux ( <i>Tachybaptus rufficollis</i> )	LC
Grive musicienne ( <i>Turdus philomelos</i> )	LC
Guêpier d'Europe ( <i>Merops apiaster</i> )	LC
Héron cendré ( <i>Ardea cinerea</i> )	LC
Hirondelle de fenêtre ( <i>Delichon urbica</i> )	LC
Hirondelle de rochers ( <i>Ptyonoprogne rupestris</i> )	LC
Hirondelle rousseline ( <i>Hirundo daurica</i> )	LC
Hirondelle rustique ( <i>Hirundo rustica</i> )	LC
Huppe fasciée ( <i>Upupa epops</i> )	LC
Linotte mélodieuse ( <i>Carduelis cannabina</i> )	LC
Martinet à ventre blanc ( <i>Tachymarptis melba</i> )	LC
Martinet noir ( <i>Apus apus</i> )	LC
Mésange charbonnière ( <i>Parus major</i> )	LC
Milan noir ( <i>Milvus migrans</i> )	LC
Moineau domestique ( <i>Passer domesticus</i> )	LC
Moineau espagnol ( <i>Passer hispaniolensis</i> )	LC
Monticole bleu ( <i>Monticola solitarius</i> )	LC
Monticole de roche ( <i>Monticola saxatilis</i> )	LC
Oedicnème criard ( <i>Burhinus oedicnemus</i> )	LC
Perdrix choukar ( <i>Alectoris chukar</i> )	LC
Petit-duc scops ( <i>Otus scops cyprius</i> )	LC
Petit Gravelot ( <i>Charadrius dubius</i> )	LC
Pie bavarde ( <i>Pica pica</i> )	LC
Pigeon biset ( <i>Columba livia</i> )	LC
Pigeon domestique ( <i>Columba livia domestica</i> )	LC
Pigeon ramier ( <i>Columba palumbus</i> )	LC
Pinson des arbres ( <i>Fringilla coelebs</i> )	LC
Pipit des arbres	LC

Taxon	UICN
( <i>Anthus trivialis</i> )	
Pipit farlouse ( <i>Anthus pratensis</i> )	LC
Pouillot véloce ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	LC
Puffin yelkouan ( <i>Puffinus yelkouan</i> )	LC
Râle d'eau ( <i>Rallus aquaticus</i> )	LC
Rougegorge familier ( <i>Erithacus rubecula</i> )	LC
Rougequeue à front blanc ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	LC
Rougequeue noir ( <i>Phoenicurus ochrurus</i> )	LC
Rousserolle effarvatte ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )	LC
Sarcelle d'hiver ( <i>Anas crecca</i> )	LC
Serin cini ( <i>Serinus serinus</i> )	LC
Sterne caugek ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	LC
Tarier des prés ( <i>Saxicola rubetra</i> )	LC
Tarier pâtre ( <i>Saxicola torquata</i> )	LC
Tarin des aulnes ( <i>Carduelis spinus</i> )	LC
Tourterelle turque ( <i>Streptopelia decaocto</i> )	LC
Traquet de Chypre ( <i>Oenanthe cyprica</i> )	LC
Traquet de Finsch ( <i>Oenanthe finschii</i> )	LC
Traquet isabelle ( <i>Oenanthe isabellina</i> )	LC
Traquet motteux ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )	LC
Traquet oreillard ( <i>Oenanthe hispanica</i> )	LC
Troglodyte mignon ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	LC
Vanneau éperonné ( <i>Vanellus spinosus</i> )	LC
Verdier d'Europe ( <i>Carduelis chloris</i> )	LC